

# 多元函数（曲面）的法向量

Dezeming Family

2021 年 9 月 2 日

DezemingFamily 系列书和小册子因为是电子书，所以可以很方便地进行修改和重新发布。如果您获得了 DezemingFamily 的系列书，可以从我们的网站 [<https://dezeming.top/>] 找到最新版。对书的内容建议和出现的错误欢迎在网站留言。

20210903: 完成第一版。


## 目录

一 一元函数的法向量	1
二 二元函数法向量	1
三 空间曲面的法向量	2
3.1 参数曲线的切线	2
3.2 曲面的切平面	3
参考文献	3

## 一 一元函数的法向量

对于一元函数  $y = f(x)$ ，其上的某一点坐标为  $(x_0, f(x_0))$ ，对应的法向量为  $(f'(x_0), -1)$ 。


首先我们知道该点的斜率为  $f'(x_0)$ ，即下图中的切线高与长的比  $\frac{\Delta y}{\Delta x}$  为  $f'(x)$ ：



所以我们可以取切线向量为  $(1, f'(x))$ 。因为法向量垂直于切线向量，所以  $\mathbf{n} \cdot (1, f'(x)) = 0$ ，所以  $\mathbf{n} = \lambda \times (f'(x), -1)$ ，这里的  $\lambda$  可以取任意值。

## 二 二元函数法向量

对于二元函数  $z = f(x, y)$ ，某一点  $(x_0, y_0, z_0)$  的法向量如下图左，可以映射到 ZOY 平面上，如图右：



我们可以求其在 ZOY 平面上的函数变化率，也就是偏导  $f'_y(x_0, y_0)$ ，得到法向量在 ZOY 平面的投影  $(f'_y(x_0, y_0), -1)$ 。

同理，可以得到法向量在 ZOY 平面的投影为  $(f'_x(x_0, y_0), -1)$ ，因此法向量我们就可以设置为：

$$(f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0), -1) \quad (二.1)$$

### 三 空间曲面的法向量


空间曲面可以描述为  $\Phi(x, y, z) = 0$ ，在某个微小区域  $(x_0, y_0, z_0)$  附近，曲面可以看为平面，在这个小区域中，设法向量为  $\mathbf{n} = (A, B, C)$ ，所以  $\mathbf{n} \cdot (x - x_0, y - y_0, z - z_0) = 0$ 。

我们设通过点  $(x_0, y_0, z_0)$  的某一条曲线的参数方程为：

$$\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \\ z = \varphi(t) \end{cases} \quad (三.1)$$

#### 3.1 参数曲线的切线

我们先研究这个曲线的切线。



设  $p_0$  点对应于  $t = t_0$  的曲线位置  $(\phi(t_0), \psi(t_0), \varphi(t_0))$ ，当  $t = t_0 + \Delta t$  时，可以得到曲面另外一点  $p_1$ ：

$$p_1 = (x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z) \quad (三.2)$$

已知空间两点  $p_0$  和  $p_1$ ，这两点构成的直线（其实就是曲线的割线）就可以计算出：

$$\frac{x - x_0}{(x_0 + \Delta x) - x_0} = \frac{y - y_0}{(y_0 + \Delta y) - y_0} = \frac{z - z_0}{(z_0 + \Delta z) - z_0} \quad (三.3)$$

当  $\Delta t \rightarrow 0$  时，割线会逐步趋近于切线。我们在分母上同时除以  $\Delta t$ ，得到：

$$\frac{x - x_0}{\frac{\Delta x}{\Delta t}} = \frac{y - y_0}{\frac{\Delta y}{\Delta t}} = \frac{z - z_0}{\frac{\Delta z}{\Delta t}} \quad (三.4)$$

令  $\Delta t \rightarrow 0$ , 得到切线方程:

$$\frac{x - x_0}{\phi'(t_0)} = \frac{y - y_0}{\psi'(t_0)} = \frac{z - z_0}{\varphi'(t_0)} \quad (三.5)$$

切线方程需要保证偏导  $\phi'(t_0)$ ,  $\psi'(t_0)$ ,  $\varphi'(t_0)$  不全为 0。

### 3.2 曲面的切平面


由切线方程可知, 切线向量为  $(\phi'(t_0), \psi'(t_0), \varphi'(t_0))$ 。

在整个曲面上, 都有恒等式  $F(\phi(t_0), \psi(t_0), \varphi(t_0)) = 0$ , 对该式求  $t = t_0$  处的全导数, 可以得到:

$$F'_x(x_0, y_0, z_0)\phi'(t_0) + F'_y(x_0, y_0, z_0)\psi'(t_0) + F'_z(x_0, y_0, z_0)\varphi'(t_0) = 0 \quad (三.6)$$

由上式, 我们提取  $\mathbf{n} = (F'_x, F'_y, F'_z)$ , 该向量与切向量垂直。

由于切线我们可以任取:



可知所有切线构成一个切平面 (已知切平面法向量和平面上某个点  $p_0$  就可以确定该平面)。而法线  $\mathbf{n}$  就是该切平面的法向量, 即曲面在该点处的法向量。

所以我们得到法向量的求法:

$$\mathbf{n} = (F'_x(x_0, y_0, z_0), F'_y(x_0, y_0, z_0), F'_z(x_0, y_0, z_0)) \quad (三.7)$$

我们还可以推导出前面得到的二元函数法向量, 对于  $z = f(x, y)$ , 可以设函数  $F(x, y, z) = f(x, y) - z = 0$ , 从而求得法向量值。

### 参考文献

[1] <https://zhuanlan.zhihu.com/p/90858099>

[2] 刘建亚. 大学数学教程. 微积分. 二 [M]. 高等教育出版社, 2003.